

4

Wenn Sie den Eindruck haben, dass sich bei Ihnen eine Überempfindlichkeitsreaktion auf Abacavir/Lamivudin Aristo® entwickelt, setzen Sie sich bitte sofort mit Ihrem Arzt in Verbindung. Notieren Sie sich hier den Namen und die Anschrift Ihres behandelnden Arztes:

Arzt: Tel.:

Wenn Ihr Arzt nicht erreichbar ist, müssen Sie sofort nach einer anderen Möglichkeit suchen, ärztlichen Rat einzuholen (z. B. die Notfallambulanz des nächstgelegenen Krankenhauses).

Für allgemeine Anfragen zu Abacavir/Lamivudin Aristo® wenden Sie sich bitte an Aristo Pharma GmbH, Tel.: +49 30 71094-4200

53 mm

85 mm

1

WICHTIG – PATIENTENPASS

**Abacavir/Lamivudin Aristo®
600 mg/300 mg Filmtabletten**
(Abacavir/Lamivudin)



Tragen Sie diese Karte immer bei sich.

PC581000-01/DE/1017

50002574/1

2

Da Abacavir/Lamivudin Aristo® Abacavir enthält, können einige Patienten, die Abacavir/Lamivudin Aristo® einnehmen, möglicherweise eine Überempfindlichkeitsreaktion (schwerwiegende allergische Reaktion) entwickeln. Diese **kann lebensbedrohlich sein**, wenn Abacavir/Lamivudin Aristo® weiterhin eingenommen wird.

SETZEN SIE SICH SOFORT MIT IHREM ARZT IN VERBINDUNG, damit er entscheiden kann, ob Sie die Therapie mit Abacavir/Lamivudin Aristo® absetzen müssen, wenn:

- 1) Sie einen Hautausschlag bekommen ODER
- 2) Sie aus mindestens ZWEI der folgenden Gruppen eines oder mehrere Symptome (Beschwerden) entwickeln:

3

- Fieber
- Kurzatmigkeit, Halsschmerzen oder Husten
- Übelkeit oder Erbrechen oder Durchfall oder Bauchschmerzen
- starke Müdigkeit oder Schmerzen oder ein allgemeines Unwohlsein

Wenn Sie Abacavir/Lamivudin Aristo® aufgrund einer solchen Überempfindlichkeitsreaktion abgesetzt haben, **NEHMEN SIE NIE WIEDER** Abacavir/Lamivudin Aristo® oder ein anderes Abacavir-haltiges Arzneimittel ein, da es **innerhalb von Stunden** zu einem lebensbedrohlichen Blutdruckabfall oder zum Tod kommen kann.

(siehe Rückseite der Karte)